



IMPORTANT MEDICAL INFO

This patient needs daily replacement therapy with cortisone.

In case of fever $>38^{\circ}\text{C}$, the daily cortisone dose should be doubled.

In case of serious illness, vomiting or diarrhea, give hydrocortisone 100 mg (>12 yr) or 50 mg (<12 yr) i.v./i.m./s.c. and start saline infusion.



Personal health information



AIVOLISÄKE-
POTILASYHDISTYS

SELLA RY

SELLASIA ME OLEMME

Personal health information

Nimi:

Syntymäpäivä:

Osoite ja puhno:

Hoitopaikka:

Veriryhmä:

Muut sairaudet:



KORTISOLIVAJEEN HÄTÄOHJE

Nimi

Henkilötunnus

Hoitava yksikkö

Kuume $>38.0^{\circ}\text{C}$ → kaksinkertaista kortisoniannos.

Huonokuntoisuus, oksentelu tai ripuli → anna hydrokortisoni 100 mg (>12 v) tai 50 mg (<12 v) i.v./i.m./s.c. ja aloita keittosuolainfuusio.

Varmista jatkohoito hoitavasta yksiköstä tai akuuttihoito-oppaasta.



Suomen Endokrinologiyhdistys

Aivolisäke-sairauteni:

- Akromegalia
- Cushing
- Prolaktinooma
- Vajaatoiminta
- Diabetes insipidus
- Muu:

ICE-yhteystiedot:

1. kontakti

Nimi:

Suhde:

Nro:

2. kontakti

Nimi:

Suhde:

Nro:

Lääkitys:

Ohjeet:

1. Taita paperi kahtia (halutessa liimaa yhteen)
2. Leikkaa reunat viivoja pitkin
3. Taita vielä kerran pystysuunnassa ja vaakasuunnassa niin saat pankkikorttikokoiseksi





Personal health information

Nimi:

Syntymäpäivä:

Osoite ja puhno:

Hoitopaikka:

Veriryhmä:

Muut sairaudet:

Aivolisäke-
sairauteni:

- Akromegalia
- Cushing
- Prolaktinooma
- Vajaatoiminta
- Diabetes insipidus
- Muu:

ICE-yhteystiedot:

1. kontakti

Nimi:

Suhde:

Nro:

2. kontakti

Nimi:

Suhde:

Nro:

Lääkitys: